

DISSERTATIO MEDICA
INAUGURALIS,
DE

RHEUMATISMO.

QUAM,
ANNUENTE SUMMO NUMINE,

Ex Auctoritate Reverendi admodum Viri,

D. GULIELMI ROBERTSON, S. S. T. P.

ACADEMIÆ EDINBURGENÆ Praefecti;

NEC NON

Amplissimi SENATUS ACADEMICI consensu,
Et nobilissimae FACULTATIS MEDICÆ decreto,

PRO GRADU DOCTORIS,

SUMMISQUE IN MEDICINA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS

RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS;

Eruditorum examini subjicit

ANDREAS INGLIS,
EDINENSIS,

Physicae Societatis Socius Honorarius.

Ad diem 12. Septembris, hora locoque solitis.

EDINBURGI:

Apud BALFOUR et SMELLIE,

Academiae Typographos.

M,DCC,LXXXVII.

DISSEMINATION OF MEDICAL

IN AFRICA

R. H. F. M. A. T. S. M. O.

AND THE

D. G. L. F. M. A. T. S. M. O.

ACADEMIC

APPLIED

TO

PRO

AND

THE

OF

A. N. D. F. M. A. T. S. M. O.

LIBRARY

THE


AND

R. H. F. M. A. T. S. M. O.

ACADEMIC

APPLIED

TO



Viro praestantissimo,

G U L I E L M O R A M S A Y,

DE BARNTON, ARMIGERO,

Virtutibus,

Quas per totum vitae decursum diligenter coluerit,

Numerosissimis vere spectabili,

Qui exemplum rarum et laudabile praebet,

Successus prosperrimos summamque opulentiam,

Quae plerisque mortalium transversos agunt,

Benevolentiam ei ingenitam moresque amabiles,

Nulla ex parte mutare valere ;

Propter amicitiam et urbanitatem singulares,

Adversus sese suasque constanter adhibitas ;

CULIUM RASAT

DE BARTON, ARMIGER.

Virtutum.

Quod per totum vitam decem diligenter colitur.

Manuscriptum vero scriptum.

Quod exemplum tantum et laudabile pariter.

Quod est exemplum tantum et laudabile pariter.

Quod est exemplum tantum et laudabile pariter.

Quod est exemplum tantum et laudabile pariter.

Quod est exemplum tantum et laudabile pariter.

Quod est exemplum tantum et laudabile pariter.

Quod est exemplum tantum et laudabile pariter.

Nec non,

Viro ingenioso,

F O R R E S T O D E W A R,

Chirurgo Edinensi,

Collegii Regii Chirurgici Edinensis Praefidi,

Neminique artis propriae peritia secundo,

Ob amorem et attentionem,

Quibus omnibus suis commodis,

Quantum in eo fuit,

Affidue consulere dignatus est ;

Hanc Dissertationem Medicam Inauguralem, ea,

Qua par est,

Observantia,

D. D. Cq.

A N D R E A S I N G L I S.

DISSERTATIO MEDICA

INAUGURALIS,

DE

RHEUMATISMO.

NONNULLI forsitan secum mirabuntur, me hujusmodi morbum, qui adeo vulgaris sit, ut paucissima vel nulla naturam ejus et curationem spectantia tironem etiam in arte Hippocratica possint latere, e numerosissimis, quae medicina longe lateque patens suppeditet, argumentis, quem in dissertatione inaugurali exequerer, potissimum selegisse. Illis vero respondeo, juvenis esse, saltem per aliquot annos postquam medicinae studere incepit, *communia* potius, quam *insolita* et *rara*, intueri. Mihi enim, non sine causa gravissima, vitio posset verti, si morbum, qui in genus humanum, singulis fere diebus, invadit, et Britannos, cives dilectissimos, saepius, quam alios, infestat,

ulla ex parte ignorarem. Si vero, contra, vitium, quod ne semel quidem in multis exemplorum millibus semet ostendit, quodque medicum aetate provectum, prudentem expertumque fugere periclitatur, non penitus perspectum cognitumque haberem, quisnam, candore et humanitate praeditus, non me excusaret, et juvenili ignorantiae parceret? Insuper inscitia in posteriore exemplo, quam in priore, multo minus periculi haberet. Hic uni tantum pauculisve ad summum, illic plurimis posset obesse. Qui praeterea, notitia *communium* probe instructus, medicinam facere incipiet, is haud dubie saepissime valetudini mortalium commodae consulere, et bonam morborum, qui curationem recipere possunt, partem depellere poterit; et igitur medicus eo longe utilior futurus est, qui, communibus neglectui nimis habitis, plurimum temporis in *propriis* et *rarissimis* contemplan-
dis et prosequendis consumpsit. Hisce autem similibusque in-
ductus materiam vulgarem non defugiendam putavi; nihil aliud exoptans, quam uti Praeceptoribus illustrissimis, quibus tot et tanta debeam, me animum ad utilissima ab illis tradita serio attendisse demonstrem.

Hic morbus, quem exequendum susceperim, et Graecos et Romanos auctores, quantum ad naturam ejus veram attinebat, adeo latuit, ut eum ab arthritide, sub qua omnes artuum dolo-
res,

res, five inflammationem haberent, five eadem destituerentur, et, ut illis placuit, ab aliquo humore orirentur, comprehendere, nullis notis certis fecernere fuerint aggressi. Nomen *ῥευματισμος*, unde judicare licet, morbum alicui humoris impetui ad partem affectam facto, vel catarrho, uti vulgo appellabatur, fuisse relatum, a Galeno primum adhibitum esse videtur. Utrum vero per id vocabulum morbum, quem *rheumatismum* recentiores appellent, vel diversum, significet, minime constat. Caeterum hoc compertum habemus, medicos omnes recentiores ad Botallum usque tantum, ut naturam morbi rite intelligerent, abfuisse, ut, contra, eum ab humoribus naturam frigidam habentibus proficisci, et igitur detractionem sanguinis inimicam esse posuerint. Hoc, quam imperfectae, immo, quam ridiculae, notiones eorum hujusce morbi fuerint, plane et evidenter ostendit. Auctor vero modo comprehensus, vincula consuetudinis inveteratae exuens, asserere non dubitavit, missiones sanguinis reiteratas ad eum sanandum esse necessarias. Quinetiam duorum exemplorum meminit, in quibus in hanc medendi viam cum prosperrimo successu processerat. Post eum Ballonius, qui Lutetiae Parisiorum, Ludovico decimo tertio rerum potente, floruit, nomen *rheumatismum* morbo primus e medicis recentioribus indidit, eum inflammationem habere, et ab arthritide vel catarrho longe differre affirmans. Praeterea his-

toriam

toriam ejus accuratam memoriae prodendam curavit, et praesidium unicum in crebris sanguinis detractionibus positum esse contendit *. In eandem super et natura morbi et curatione sententiam postea concesserunt viri docti celebresque Riverius et Sydenhamus.

Sub nomine *rheumatismus* utrumque morbi genus, *acutum* nempe et *chronicum*, comprehendere et exequi decrevi. Inter differendum de illis, vestigiis Culleni aliorumque auctorum celebrium, quantum potero, insistam.

Omnes ante Cullenum Nosologi definitiones morbi admodum imperfectas tradiderunt, quae et ad naturam ejus designandam, et ad eum ab aliis artuum vitiis distinguendum, perperam accommodari videntur. Igitur, illis ex toto praetermissis, Culleniana sola, utpote quae omnibus palmam facile praeripiat, utar. Sic autem sese habet ea, quae genus morbi acutum spectat. “ Morbus ab externa, et plerumque evidente causa; pyrexia; dolor circa articulos, musculorum tractum sequens, genua et reliquos majores, potius quam pedum vel manuum articulos, infestans, calore externo auctus.”

HISTORIA

* Vide Pringle's Diseases of the Army, P. 3. chap. 2. sect. 7. edit. 2.

HISTORIA MORBI.

In plagis frigidis frequenter, in calidis rarius, semet ostendit. Autumno et vere saepissime, hyeme, dum frigus non parvum constansque dominatur, minus crebro apparet. Hoc haud dubie, cur in Suecia et Laplandia ex toto fere ignotus sit, in causa est. Rarissime, caloribus aestivis invalescentibus, invadit. Calor quidem ei inimicissimus esse videtur. Namque Cleghornius celebris, inter morbos insulae Balearicae Minori proprios depingendos, semel tantum, quod notabile est, hujusce morbi mentionem injicit. Quinetiam Hillarius, dum morbos, qui insulam Barbadoensem infestant, exsequitur, hunc sibi perquam raro in conspectum sese dare affirmat. Insuper multi memoriae produnt, in terris, quae ad Austrum magis etiamnum vergunt, vix unquam apparere, nisi causa excitans potentissima corpori fuerit admota. Qualibet tamen tempestate, et in qualibet regione, si vicissitudines frigoris et caloris in tempus sint frequentes, accedere potest. Nec in iis, quibus nondum multum aetatis accesserit, nec in iis, qui aetate provectiores sint, frequenter apparet. Tempore, quod pubertatem inter et annum aetatis trigesimum quintum intercedit, aliqua ex parte circumscriptus

scriptus esse videtur. In quodlibet temperamentum, sed in sanguineum potissimum, invadit, mulieres saepius, quam viros exercens.

Morbum in primis insigniunt dolores artuum, hos solos plerumque, sed partes musculares quoque nonnunquam, afficientes. Creberrime secundum musculorum decursum, ab uno artu ad alium, rapide semet extendunt, et semper actione musculorum qui artui artubusve laborantibus proprii sunt, plurimum intenduntur. Qui artus frequentissime afficiuntur, ii sunt coxae, genua, humeri et cubiti, nempe majores. Tali et carpi quoque saepe torquentur; articuli vero minores, quales digitorum pedum manuumve proprii sunt, raro aliquid detrimenti inde capiunt. Quanquam morbus una corporis parte tantum interdum continetur; multas tamen admodum frequenter exercet. Rebus ita se habentibus, a rigore et horrore incipit, quos protinus excipiunt reliqua pyrexiae signa, praesertim ictus arteriarum frequentes, pleni, et duri. Pyrexia nonnunquam ante semet ostendit, quam ulli dolores percipiuntur; sed dolores saepius in certis partibus prius sentiuntur, quam ulla febris signa apparent. Cum nihil pyrexiae subest, dolor aliquando uno articulo continetur. Si vero febris non mediocris urgeat, dolor, quanquam in uno artu potissimum federe potest, complures alios eodem tempore

tempore saepissime occupat, ab uno ad alium plerumque migrans. In universos quoque corporis musculos interdum invadit, adeo ut ex toto fere immobile reddatur, et nullas omnino, paucissimasve functiones exercere possit †. Quinetiam in uno levatus, in alio gravior evadit. Eundem plerumque non diu tenet, sed locum saepe mutat, et artus, quos prius invaserat, aliquando repetit. Hoc modo in magnam longitudinem saepe producit morbus, si nobiscum, quanta ejus gravitas sit, reputamus. Pyrexia quidem raro ultra duas tresve septimanas, graviter urget; quanquam aliquando ex parte levata spatium totum sex hebdomadarum explet.

Quae febris rheumatismum comitatur, ea unoquoque vespere ingravescit, et noctu maxime saevit. Per tempus nocturnum quoque dolores violentiores evadunt, et ab uno artu ad alium transeunt. Hinc quoque auctum accipere videntur, quod corpus accuratius tegitur calidiusque servatur.

Postquam artus dolore aliquamdiu fuit tentatus, plerumque quoque rubescit, tumescit, et tactui dolet. Tumor accedens
dolorem

† Vide the Manuscript Lectures of the late celebrated Dr Gregory.

dolorem artus plerumque levat, sed eundem non semper ex toto depellit, nec artum adversus reditum ejus tutum reddit.

Morbus aliquanto sudationis plerumque stipatur, quae brevi post initium oritur. Raro vero libera aut copiosa est, et raro quoque dolores levat morbumve judicat. Per morbi decursum urina colorata est, et, sub initium, sedimenti expers. Caeterum, morbo progrediente et pyrexia longiores remissiones adeptae, sedimentum pulverem lateritium referens deponit. Hoc vero finem morbi minime facit; namque saepe diu manet, postquam sedimentum hujusmodi in urina semet ostendit. Qui sanguis hoc in morbo e venis extrahitur, is crustam coriaceam, indicem diatheseos phlogisticae evidentissimam, superficiei suae innatantem, nunquam non exhibet. Alvus per totum morbi spatium dura est. Quod idem in plerisque morbis inflammationem habentibus incidit; namque diarrhoea, vel profusio alvi, in omnibus hujusmodi morbis, phaenomenon rarissimum est.

Quamquam rheumatismus acutus phlegmasiis, quarum naturae plurimum ei inest, optimo jure accenseatur; ab iis omnibus tamen hoc plane evidenterque discrepat, quod non suppuratione finiri consuevit. Haec fere nunquam incidit. Morbus quidem, ut humor pellucidus gelatinosus in vaginas tendinum effundatur, aliquando

aliquando facit. Si humores hujusmodi frequenter effundi ponantur, iidem vulgo rursus absorbeantur oportet. Namque Cullenus celeberrimus, omnium morbos spectantium observator fidelissimus, se nunquam tales inde tumores oriri vidisse testatur, quales, uti humor iis contentus emitteretur, opem scalpelli chirurgici depostularunt. Eos tamen aliis semet ostendisse confite-
tur.

Gravitate pyrexiae tandem diminuta, dolores articulorum, si manent, minus graves fiunt, loco certo magis circumscribuntur, unum pauculosve ad summum artus tantum occupantes, et fedem mutare minus periclitantur.

Si pyrexia, quae rheumatismum comitatur, omnino cessat; si tumor, et potissimum artuum rubor, ex toto decedunt; sed dolores tamen articulos singulares etiamnum afficere pergunt, qui rigidi et frigidi manent, qui sensui molestiae, motu adhibito, vel mutationibus coeli incidentibus, patent, qui sine difficultate sudore cogi nequeunt; vel, dum reliquum corpus sudore copioso et calido diffluit, tenace et frigido tantum humectantur: Si praesertim dolores artuum modo positorum frigore intenduntur, et, contra, calore illis admoto levantur, *rheumatismum chronicum* genuinum adesse, concludere licet.

Hic autem articulos diversos afficere potest; eos vero potissimum, qui multis musculis circumdantur, quorumve musculi in nifibus valentissimis et maxime continuis edendis adhibentur, vexare periclitatur. Res ita se habet in vertebrae lumborum, quarum affectus *lumbago*; vel in coxa, cujus *ischias*, vel *sciatica* appellatur.

Hanc morbi historiam ad finem perducturi notemus oportet, utrumque rheumatismi, quem supra depinxerimus, genus insulam Britannicam, ob temperiem coeli inconstantem et mutabilem, ante omnes alias forsitan totius orbis terrarum regiones, graviter exercere et infestare.

D I A G N O S I S.

Cum medici facilius in errorem de natura morbi, quam de via eidem ab aliis rite distincto medendi, incidere periclitentur, unicuique in hoc desudandum et elaborandum est, ut morbum, quem depellere conaturus sit, ab omni alio accurate prius fecernat, quam curationem ejus sibi suscipit. Hoc salus aegrotantis, hoc existimatio sua exigit. Cum res ita se habeat, nonnihil operae

pærae curæque in discriminibus, quæ rheumatismum inter et morbos eum referentes intercedunt, illustrandis ponendum ducō. Prius autem unum rheumatismi ipsius genus ab altero, deinde utrumque ab aliis morbis distinguere conabor.

1. Genus rheumatismi acutum a chronico non difficulter discernitur. Namque in illo semper adsunt pyrexia, artuum tumor ruborque; dolores, qui externo calore augentur, et noctu potissimum urgent. In hoc, contra, pyrexia nulla, nullus plerumque tumor. Insuper dolores artuum vel musculorum, ut definitio Culleniana demonstrat, sub motu præsertim augentur, plus minusve fugaces sunt, et calore lecti vel alio externo levantur.—Artus ipsi debiles rigidique sunt, et facile, sæpe sponte, frigescunt. Haec duo genera a se invicem distinguere operæ pretium esse duxi, quod curatio eorum, ut postea ostendetur, magnopere differt.

2. Dolores a lue venerea proficiscentes a rheumatismi propriis dignoscantur necesse est. Quantum priores spectat, media ossa solidissima, ut cranium tibiamve, tenent, et profunde sedere videntur; posteriores vero exteriora corporis occupant, tractum musculorum sequuntur, et ossa extrema articulosque, potissimum majores, exercent. Præterea, quodocunque dolores morbi

morbi venerei proles sunt, alia ejus morbi signa aut praecesserunt, aut subsunt, unde, qualis dolorum origo sit, conjicere possumus.

3. Qui dolores rheumatismum comitantur, ii ab illis, quos scorbutus facit, diligenter quoque sunt distinguendi. Nec hoc factu difficile. Hi pulsibus arteriarum exilibus et inaequalibus, signis proclivitatis ad putredinem evidentibus, lassitudine et debilitate insignibus; maculis in cute diversicoloribus, plerumque livescantibus, praesertim ad pilorum radices; proclivitate ad haemorrhagias, &c. stipantur. His vero omnibus destituuntur dolores, qui a rheumatismo profluunt.

4. Dolores, qui vulgo *nervosi* appellantur, ab iis, qui rheumatismi comites sunt, fecerni quoque debent. Horum origo et causae notae sunt. Fons vero, unde illi oriantur, summa obscuritate involutus est, immo ex toto ignotus. Quales sint, hinc tantum discere possumus, quod alia signa nervosa iis plerumque accedunt:

5. Non parum similitudinis rheumatismum inter et podagram evidenter intercedit. Satis certo tamen dignosci possunt; namque plurimis, iisque minime obscuris, inter sese differunt. Pri-

num autem discrimen a causis, unde proficiantur, petendum. Rheumatismus a causa externa, et plerumque evidente, frigore nempe ; podagra nec ab hoc, nec ab alia quavis causa externa oritur, sed ab aliqua interna conditione morbida, cujus naturam assequi nondum potuit pathologorum acumen, pendet. Loco quoque, quem tenent, differunt. Rheumatismus artus majores, rarissime minores, et superiores saepius quam inferiores occupat. Podagra, contra, minores et inferiores corripit, et uno, ut pollice pedis, saepe circumscribitur. Rheumatismus vero semet uno articulo rarius continet ; sed complures eodem tempore invadere consuevit, et tantum abest, ut articulis solis contineatur, ut tractum, contra, musculorum evidentissime sequatur. Podagra a labe haereditaria, saltem plerisque in exemplis, profluit ; nullam vero hujusmodi originem agnoscit rheumatismus. Accessionem podagrae, praeterquam in nonnullis juvenibus et valentioribus, antecedere solent, concoctio diminuta, acor, inflatio et alia idem genus signa, et in senibus praecipue, affectus nervosi, ut asthma et spirandi difficultas. Nullis vero hujusmodi notis praecedentibus, rheumatismus invadit. Porro cum affectibus viscerum internorum frequenter alternat podagra, quod rheumatismus, si in idoneam ei medendi viam procedatur, rarissime facere consuevit. Quinetiam, quantum ad tempus, quo invadunt, attinet, magnopere discrepant morbi.

Rheumatismus, ut supra comprehendimus, eo quod pubertatem inter et annum aetatis trigesimum quintum interest, spatio magna ex parte circumscriptus esse videtur. Podagra vero mortales, ante mediam aetatem, raro incipit affligere, nisi cum labes haereditaria admodum valens potensque est. Rebus ita se habentibus, infra annum aetatis vigesimum aliquando apparuit. Exempli etiam non desunt, ubi pueros, qui septem octove annos tantum habuerunt, cibo animali nimis liberaliter uti incaute permisos, infestavit. Quantum sexum et temperamentum spectat, manifeste quoque differunt. Podagra non tam exquisite sanguinei temperamenti, quam habitus plenioris, corporum magnorum, crassorum, et asperorum, sexus virilis aut mulierum valentiorum, quas viragines appellare consuevimus, appetens esse videtur, et eunuchis parcit. Rheumatismus vero temperamentum sanguineum constanter, et mulieres praesertim, exercet. Podagra certos circuitus habet, et ex intervallis brevioribus vel longioribus redire solet; sed rheumatismus minime periodicus est, et semel tantum per totum vitae decursum accedere potest. Denique dolor rheumatismi, saltem acuti, magis, quam podagrae, mobilis est, et locum saepius mutat. Hoc vero notabile est, quod locus, unde dolor alio translatus est, minus, quam in podagra, levatur. Cum podagra locum mutat, articulum alterius

lateris respondentem petit ; sed rheumatismus ad alteram corporis extremitatem plerumque migrat.

Quae modo posui, ea, me iudice, ad podagram a rheumatismo fecernendam ex toto sufficient.

C A U S Æ R E M O T Æ.

Sub his autem comprehenduntur *feminium* et *causa excitans*.

1. *Seminium*.—Hoc in diathesi phlogistica, quae, uti Cullenus in praelectionibus suis super usu practico memoriae prodit, tonus systematis totius arteriosi adauctus, vel contractilitas forsitan fibrarum ejusdem muscularium intensior est, consistere videtur. Haec autem minime inflammatio ipsa est, sed conditio corporis tantum ad eam recipiendam, si ei aliquo tempore futuro causa excitans, postea memoranda, accesserit, paratissima. Diathesin hujusmodi pro *feminio* hujus morbi unico habendam esse, testantur omnia quae ortui ejus favent, vel mortales ad eum proclives efficiunt ; tempus nempe vitae, quo magna ex parte

circumscriptus

circumscriptus esse videtur; status hominum, qui in eum incidere consueverunt, corporeus victusque eorundem ratio; regionum, quas infestat, natura, et tempestates, quibus in genus humanum faevire solet, &c. Rheumatismum autem mortales a pubertate ad mediam aetatem usque frequentius vexare, supra posuimus. Qualis vero diathesis per hocce spatium in systemate corporeo dominatur? Phlogistica haud dubie, quae homines phlegmaticis omnigenis, et rheumatismo in reliquis, opportunos reddit. Praeterea qualis est status corporeus, hoc stadio vitae humanae nondum incepto aut finito? Nonne debilis et relaxatus, et igitur inflammationi parum amicus? Quod evidenter in causa est, cur morbus, quem exequimur, infantes nunquam, pueros et aetate profectos rarius, invadat. Insuper, qualis est eorum, qui hoc morbo conflictari solent, status corporeus, qualisque victus ratio? Nonne ille plenus, haemorrhagicus, solito valentior? Nonne haec quoque plerumque plena et opipara? Qui enim rheumatismo implicantur, ii, saltem plerimi eorum, vitam sedentariam agunt, et luxui, crapulae, et intemperantiae omnigenae, dediti sunt. Quales porro regiones infestat? An ad Austrum vergentes, et sub ardore Solis propinqui sitas, ubi fabrica corporis mollior, et fibrae musculares relaxatae et debiles, non tensae et rigidae sunt; vel ad septentrionem spectantes, ubi robur multo majus corporibus inest, et

fibrae

fibrae musculares plus vigoris et elateris habent? In has, procul dubio, ut Britannia nostra multaeque aliae regiones in iisdem similibusve latitudinis Borealis gradibus sitae, nimis certo testantur, imperium saevissimum tenet. Quali tempestate denique accedit? Non aestate, cujus calores intensi ei robori tonoque, quae ortui ejus favent, adversantur; sed vere et autumnno, cum frigus non modicum, aliquando permagnum, dominatur, quanquam cum calore nonnunquam alternat. Hoc vero, ut postea plenius monstrabitur, ad morbum movendum aliqua ex parte necessarium esse videtur; namque frigus hyemale, si continuum sit, unoque tenore pergat, et nullas variationes subeat, modo lenius, modo intensius evadens, pauciores rheumatismos, experientia teste, quam verum vel autumnale, progignit. Ratiocinio quidem, quod adhibuerim, hoc forsitan objici potest, quod e morbis antecedentibus convalescentes, et profluviiis immodicis debilitati, in quibus nihil diatheseos phlogisticae plenitudinisve adesse possis suspicari, rheumatismo interdum corripiuntur. Acutum vero morbi genus et inflammationem, quae id comitatur, graviolem in hominibus hujuscemodi prius oriri posse nego, quam magna ex parte convaluerunt, et vires, saltem mediocres, recuperarunt. Quam brevi vero spatio quidem aegrotantes hujusmodi restituantur, quamque subito plenitudo, etiam morbida, exinanitionem per-

magnam excipiat, neminem, qui medicinam primoribus labris degustaverit, potest latere.

Quo hanc dissertationis partem ad finem perducamus, nonne varia, quorum mentionem supra fecerimus, feminium rheumatismi in diathesi phlogistica consistere plane evidenterque demonstrant? Quid iis ad statum hujusmodi corporeum prognerandum efficacius esse potest? Non quidem inficiamur morbum, nullo, saltem evidente, feminio substante, aliquando excitari posse, si causa excitans, quae corpori admoveatur, fuerit admodum valens.

2. *Causa excitans.*—Haec autem plerumque est frigus corpori applicatum. Singulares vero et illius et hujus conditiones prius subsint necesse est, quam frigus corpori noxam inferre potest. Illud infra gradum thermometri Fahrenheiteani sexagesimum secundum descendat, et diu, ut sub forma vestium humidarum, applicetur; hoc praeter consuetudinem calefiat; vel pars ejus certa, reliquis calidis fervatis, frigori objiciatur oportet. Proximum est, ut rationem horum philosophicam reddere conemur.

Calor autem naturalis corpori humano unicuique sano proprius gradum thermometri supra dicti nonagesimum octavum adaequat.

adaequat. In omni corporis parte idem est, in universum systema aequaliter diffusus. Cum vero hicce caloris gradus valetudini commodae omnino necessarius sit, eum, quo principium vitale debito tepore nunquam non foveatur, artificio singulari conservandum curavit rerum natura Creatrix. Namque corpori potestatem caloris progenerandi sapiens iniecit. Haec vero ad calorem corporis idoneum tuendum non sufficit, si temperies aëria infra gradum sexagesimum secundum descendit diuque ibi manserit. Quamdiu hunc gradum superat, licet corporea multo inferior sit, inter calorem aëris externi et corporis aequilibrium brevi rursus restituitur. Si, contra, longe longeque infra hunc subsidet, principium vitale vi sua sedante extinguere periclitabitur; quod quidem saepe facit. Nihil vero hujusmodi timendum est, si non aliquantum infra gradum trigessimum secundum descendat. Etenim hunc inter et sexagesimum secundum vim longe diversam, stimulantem nempe, edit. Igitur si frigus inter hosce duos gradus modo comprehensos intercedens corpori admoveatur, eidem universo, praesertim vero systemati sanguifero, praeter consuetudinem, diathesi phlogistica substante, sensibili et irritabili stimulo acerrimo erit. Et, licet uni parti tantum applicetur, ob consensum mirandum quo omnes corporis partes inter se nexu arctissimo junguntur, et plerisque affectus secum invicem facillime communicant, effectus suos

in systema totum brevi diffundet. Si vis frigoris tertia, adstringens nempe, potestati proxime memoratae accedit, et quidem ab ea nunquam potest disjungi, tonus systematis arteriosi magis magisque etiamnum augebitur, et nifus ejusdem in contractionem insolitus orietur. Insuper, cursus humorum, ob partes externas spasmodice constrictas, interiora corporis versus fiet, et sanguis quantitate insolita in cavis internis in posterum accumulabitur. Hoc autem facillime in artubus incidet, quia non aeque, ac reliquae membrorum partes, ope telae cellulosae ab injuriis frigoris defenduntur:

Quos frigoris in corpus effectus depinximus, ii multo certius edentur, si corpus ante praeter consuetudinem quolibet modo fuerit calefactum. Hinc insolitam irritabilitatem sibi comparare videtur, quae, ut constrictio spasmodica a frigore proficiscens validior, et omnia detrimenta inde capta multo graviora sint, plane manifesteque facit. Quae in plagis calidioribus constanter incidere consuerunt, ea hanc nostram opinionem magnopere suffulciunt. Ibi frigoris noxae gradui caloris praecedentis, pro rata ratione, gravitate semper respondent. Cur autem effectus frigoris ibi violentiores sunt? Haud dubie, quod calor intensus irritabilitatem corporibus humanis, quae in qualibet regione sub septentrionibus sita magna ex parte ignota est, conciliat. Quinetiam

tiam silentio non praetereundum est, effectus frigoris nocivos constanter fere eo graviores esse, quo diutius corpori admove-
tur. Igitur vestimenta madefacta diuque gesta corpori sum-
mae noxae esse consueverunt. Praeterea, si frigus parti singulari,
sub forma fluenti aërii, applicatur, dum reliquum corpus calidum
servatur, et igitur magis relaxatum et irritabile est, effectus per-
niciosissimos frequenter edit, spasnum prius loco, cui fuit ad-
motum, deinde corpori universo, validissimum, et aliquando insu-
perabilem fere, inferens, et igitur impetum humorum a superfi-
cie interiora corporis versus magnum et repentinum faciens.

Ita rationem, qua frigus in corpus certo modo affectum, in
hoc morbo excitando, agat, exponere sum conatus. Duae e vi-
ribus tribus, frigori vulgo tributis, stimulans nempe et adstrin-
gens, conjunctae in hac operatione, uti plane videre est, exercen-
tur. Quod ad genus morbi chronicum spectat, id rheumatif-
mum acutum antecedentem, nifus violentiores et subluxationes,
ut causas suas excitantes praecipuas, agnoscit. Hic forsitan a-
licui in mentem veniet rogare : Quomodo fit, ut causa omnino
eadem alios homines longe aliis modis afficiat ; in uno catar-
rhum, in altero pleuritidem, in tertio anginam, in quarto rheu-
matifmum, in quinto synocham, &c. excitans ? Quantum ad
memetipsum attinet, meam hujusce rei ignorantiam plane con-
fiteor,

ſiteor, et alii forſitan multo doctiores et ſagaciores idem facere cogentur. Si conjecturam meram vero liceat proferre, unumquodque corpus forſitan ab omni alio plus minusve differt, et ſeminium ſibi proprium habet, quod facit, ut ad morbum ſingularem, ante omnes alios, per totum vitae decurſum, proclive ſit. Hinc, ſi res ita ſeſe habet, ſit, ut eadem cauſa alios morbos in aliis hominibus, moveat.

C A U S A P R O X I M A.

Haec autem eſt proles ſeminii cauſaeque excitantis communis, vel effectus eorundem conjunctus, viz. ſanguis praeter naturam in arterioliſ ligamentorum artuum, vel aponeuroſeos muſculorum tendineae, congeſtus. Quae ſanguinis accumulatio, et propter molem ſuam nimiam, et propter vaſa ſanguifera aliqua ex parte forſitan ante ſpaſmodice conſtricta, arteriolas modo poſitas magnopere ſtimulat, et nonnihil diſtendit, ſummum dolorem multumque inflammationis movens, et iter per eas liberum fruſtra ſibi quaerens. Rebus ita ſe habentibus, vires naturae medicatrices, quaſi conſilio ſanguinis congeſtionem tollendi, impetum circuitus humorum magis etiamnum adaugent ; quod,

horrorem

Horrorem et rigorem excitando, et arteriis extremis spasmum inferendo, praestare videntur. Ita proxima hujusce morbi causa in congestione sanguinis nimia loco propria, cui spasmus vasorum extremorum et omnia pyrexiae signa accedunt, quantum disci potest, consistit. Huic vero, Culleno celeberrimo teste, adjungi videtur affectus fibrarum musculorum singularis, quem aliquantum rigiditatis esse vir doctus existimat.

Abfit, ut opiniones quorundam, etiam magni nominis et fa-
mae, a modo prolata longe diversas, super causa rheumatismi
proxima silentio praeteream. Eam in lentore humorum posuit
Boerhaavius illustris, ejusque aemuli. Hunc vero lentorem ex-
istere, nec magister venerabilis, nec discipuli unquam demon-
strare potuerunt. Cullenus sagax, contra, cum in oeconomia
animali subesse non posse, quin exitium vitae subitaneum infer-
ret, argumentis non facile refellendis probavit. Doctrinam igitur,
utpote quae nulli fundamento stabili et certo innitatur, ex
toto repudiandam puto. Alii in animum sibi induxerunt, acri-
moniam singularem pro causa rheumatismi proxima habere.
Materiam acrem quidem nervis admotam morbum rheumatismo
similem posse movere nemo ignorat. Exemplum hujus luculen-
tum in odontalgia habemus. Caeterum, uti Cullenus illustrissi-
mus notat, nihil in hoc morbo subesse videtur, unde humores
aliquam

aliquam mutationem subiisse, vel aliquid acrimoniae sibi comparasse, potest concludi.

Quantum ad genus rheumatismi alterum, nempe chronicum, attinet, causa ejus proxima longe diversa esse videtur. Eam in atonia fibrarum muscularium vaforumque sanguiferorum partis laborantis spasmodica, cui contractio illarum rigiditasque accedunt, positam esse mihi met persuasum habeo. Rem ita se habere clare monstrare videntur causae, unde proficiscitur, signa, curatio.

QUORUNDAM E SIGNIS EXPLICATIO.

Pleraque signorum, cum a causa proxima supra proposita, et satis clare, ut spero, explicata, recta profluant, vix ullius illustrationis possunt indigere. Paucissimorum igitur tantum explicationem tradere decrevi.

1. *Ruboris et tumoris partis laborantis.*—Hi haud dubie ab insolita sanguinis in eo, qui laborat, loco quantitate congesta, proficiscuntur. Hoc per se adeo manifestum est, ut ei diutius immorari ex toto inutile foret.

2. *Doloris acuti*.—Hic ab impetu humorum nimio partem affectam versus facto plane pendet. Omnia vasa sanguifera nervulis sibi propriis sunt instructa, et igitur non parum sensibilitatis habent. Si igitur impetu sanguinis insolito, ut in rheumatismo, ultra diametrum justam et naturalem distendantur, dolore afficiantur oportet. Hoc omnibus corporis partibus commune est. Cum vero vasa, quae in rheumatismo afficiuntur, in vaginis musculorum firmis et tendinibus sedeant; et idcirco undique valide constringantur, non sine difficultate summa, et, hanc ob causam, non sine acutissimo dolore, expandi et dilatari possunt. Praeterea, sedes eorum talis est, qualis vix effusionem incidere patitur, quae, in aliis corporis locis, vasa praeter consuetudinem distensa parte humorum, quos vehunt, liberat, et ita ea relaxat. Hoc idem in causa est, cur hic morbus vix unquam suppuratione finiatur. Namque, ut experimenta virorum clarorum Pringelii et Gaberi ostendunt, nulla suppuratio, nisi pars lymphae coagulabilis effundatur, incidere potest. Aliquid humoris glutinosi quidem in vaginas tendinum nonnunquam effundi confitemur; namque cadavera incisa hoc evenisse testantur. Cum vero tumores inde rarissime nascantur, effusionem hujusmodi parum frequentem esse, vel humorem, postquam exhalavit, fere semper absorberi suspicamur. Et denique qualiscunque sit, ad pus progenerandum perperam accommodari videtur;

tur; etenim nihil fere suppuratione in hoc morbo rarius esse, probe noverunt medici.

3. *Ejusdem tractum musculorum sequentis.*—Hic, ut alibi, vestigiis praeceptoris sagacis, nempe celeberrimi Culleni, insistendum est. Affectus fibrarum muscularium singularis, inquit, vel rigiditas, in causa esse videtur, cur dolores ab uno artu ad alium, secundum decursum musculorum, propagentur: Nec mirum est, hos in musculis extremis, ubi in artus desinunt, gravissime feriri, cum oscillationes ultra hos nequeant patere.

P R O G N O S I S.

Rheumatismus, dum corpus externum tenet, parum nihilve periculi habet; nulla etenim exempla, quibus fides possit haberi, quantum meminerim, produntur memoriae, ubi aliquis eo fuit extinctus. Nonnunquam a fede solita ad caput, pulmones, et alia viscera interna, migrare fertur, et apoplexiam, paralyfin, delirium, pneumoniam, morbosque similes facere. Si vero hoc eveniat, animus mihi non parum inclinatur, ut morbum non pro rheumatismo vero et genuino, sed pro arthritidis specie, habeam.



